

Protocol zaaien en beheren pakket bloemenblok.

In deze zaai- en beheerinstructie vindt u een aantal aandachtspunten voor de aanleg en het beheer van het ANLb beheerpakket bloemenblok. De pakketeisen en beheervorschriften zijn te vinden op de website www.sudwestkust.nl

1.

a. Grondbewerking vooraf (periode begin april - half mei)

Om een schone start te kunnen maken dient er een kerende grondbewerking te worden uitgevoerd. De grondbewerking, voor een vals zaaibed, dient te worden gedaan door middel van frezen (en eventueel ploegen). Er mag van tevoren niets worden doodgespoten.

Maak minimaal 1x een vals zaaibed (zie hieronder).

b. Vals zaaibed: (periode begin april - half mei)

Bewerk enkele weken vóór de daadwerkelijke inzaai van de beheereenheid de grond licht en ondiep (2 à 3 cm) met de rotorkoepel of triltandcultivator. Dit stimuleert de kieming van onkruiden.

Ongeveer een week later, bij groeizaam weer, gaan de onkruiden opkomen. Voer, bij droog weer, nogmaals de grondbewerking op dezelfde manier uit, licht en ondiep. De gekiemde onkruiden sterven af en de nieuwe kunnen nogmaals opkomen. Hoe minder onkruiden er nu opkomen hoe beter het bloemenblok c.q. bloemenrand zal slagen.

NB. Soms lijkt het in april/ begin mei alsof er geen onkruiden opkomen. Vaak is de grond nog niet warm genoeg. Dus zaai liever wat later (uiterlijk eind mei) dan te vroeg om het vals zaaibed goed uit te kunnen voeren.

2. Zaaien (periode half mei – eind mei)

Het zaaien wordt gedaan met de zaaimachine (geen kunstmeststrooier).

Het mengsel bestaat zowel uit kleine als grote zaden. Advies is om een paar keer te “roeren”, zodat de zaden gemixt gezaaid worden. Indien het kleinere oppervlaktes betreft kan er gekozen worden voor inzaai met de hand. Meng hier de zaden goed met zand en strooi dit handmatig en gelijkmatig verdeeld uit. Er kan nog worden gekozen om een kalkgift met het zaaien mee te geven.

Regen

Ideaal voor ontkieming is dat er na het zaaien snel regen komt. Bij een week droog weer in vooruitzicht is de kans op een succesvol gewas kleiner. Bij droogte wordt geadviseerd bevloeiing toe te passen om het resultaat te vergroten. Bij droogte wordt aanrollen aanbevolen om de kieming te bevorderen.

3. Maaien en beheren

Een bloemenblok die in het voorjaar (mei) wordt gezaaid, wordt dat jaar in zijn geheel vóór

31 december niet gemaaid. Deze dient in het volgende voorjaar (maart-april) te worden gemaaid.

Een bloemenblok die in het najaar (september-oktober) wordt gezaaid, wordt in zijn geheel het jaar erop vóór 31 december niet gemaaid maar in het voorjaar daarop.

Het maaisel dient te worden afgevoerd. Een maai- zuigcombinatie is niet toegestaan.

De voorkeur gaat uit naar maaien met een weiland-bloter of schotelmaaier.

De maaihoogte is 20-30 cm boven het maaiveld. **Maai zeker niet te kort!**

Elk voorjaar wordt 50% van het bloemenblok ondergewerkt en opnieuw ingezaaid. Kies hierbij voor het minst geslaagde deel om opnieuw in te zaaien. In het volgende voorjaar wordt de andere 50% ondergewerkt en opnieuw ingezaaid etc. etc.

Bij een slechte opkomst, extreem hoge onkruiddruk of vergrassing graag contact opnemen met Collectief Sudwestkust.

De oppervlakte mag niet worden bemest. Mochten er haarden van onkruid ontstaan in de beheereenheid dan mag dit pleksgewijs worden bestreden. De aanbeveling is om dit handmatig te doen. **Let op!** Het valse zaaibed is zeer belangrijk voor een goede opkomst van het mengsel.

Normaal slootonderhoud mag in het najaar worden uitgevoerd. Sloopbagger niet in het bloemenblok c.q. bloemenrand deponeren. Bij bijzondere slootwerkzaamheden neemt u contact op met Collectief Sudwestkust.

Advies Gewascodes RVO

Bij het beheerpakket bloemenblok adviseren wij vanuit het ANLb, afhankelijk van het hoofdgewas, de volgende code: 1926; Agrarisch Natuurmengsel. Wanneer het perceel/ rand voor meer dan 50% bestaat uit een bepaald gewas, dan kunt u de code van het betreffende hoofdgewas toepassen.

Let op! U moet zelf bij de keuze van de gewascodes bekijken of dit past op uw bedrijf en hoe het zit met eventuele andere regelingen.

Specificaties mengsel

Bloemenblok		%
Centaurea cyanus wild	Korenbloem	18
Onobrychis viciifolia	Esparcette	14
Trifolium incarnatum	Incarnaatklaver	12
Medicago sativa	Luzerne	10
Trifolium pratense	Rode Klaver	8,5
Plantago lanceolata	Smalle Weegbree	8
Trifolium repens	Witte Klaver	8
Papaver rhoeas Red	Klaproos	4
Chrysanthemum segetum	Ganzebloem	3
Matricaria recutita	Echte Kamille	2
Anthemis tinctoria	Gele Kamille	2
Chrysanthemum leucanthemum	Margriet	2
Matricaria inodora	Reukloze Kamille	2
Sanguisorba minor	Kleine Pimpernel	2
Malva moschata	Muskuskaasjeskruid	1
Daucus carota	Wilde Wortel	1
Anthyllis vulneraria	Wondklaver	1
Centaurea jacea	Knoopkruid	1
Silene dioica	Dagkoekkoeksbloem	0,5
Zaadichtheid		
17,5kg/ha		



*** Een SKAL-gecertificeerd mengsel is ook beschikbaar maar heeft een aangepaste samenstelling.**